



Rafael Matias 2006

Parus caeruleus

chapim-azul

Distribuição mundial e europeia


A espécie distribui-se pelo Paleártico ocidental, ocorrendo na Europa, África setentrional e Ásia Menor. Na Europa, ocorre da Península Ibérica e ilhas Canárias até ao centro da Escandinávia e daí até ao Cáucaso.

Distribuição em Portugal


O chapim-azul nidifica no território continental onde tem uma distribuição contínua de norte a sul, sendo todavia mais abundante a sul do rio Tejo. Embora seja considerada uma ave florestal, ocorre numa gama muito variada de áreas com coberto arbóreo como florestas de folha caduca, galerias ripícolas, montados, olivais e outros pomares, sebes arbóreas, jardins e parques urbanos. Em grandes cidades como Lisboa, utiliza as árvores ornamentais que se situam ao longo das ruas e avenidas. Este chapim é pouco frequente em povoamentos extensos de pinheiros e de eucaliptos, facto que poderá explicar a menor abundância da espécie no Centro e no litoral Norte. No Alentejo a espécie exhibe padrões de abundância relativa elevados em praticamente toda a região, com destaque para as zonas com montado de sobre do Alto Alentejo. Os valores mais baixos de abundância nesta região coincidem com algumas áreas com coberto arbóreo esparso, designadamente nos concelhos de Mértola e de Castro Verde.

A comparação da distribuição actual com a obtida no atlas nacional anterior permite verificar que se manteve a mancha contínua em todo o território continental.

texto João E. Rabaça, ilustração Rafael Matias



Distribuição



Abundância relativa

