



Parus cristatus

chapim-de-poupa

Distribuição mundial e europeia


A espécie distribui-se pelo Paleártico. Ocorre da Europa ocidental até aos montes Urais e de forma mais dispersa na região mediterrânica central, estando ainda ausente de parte das regiões mais setentrionais do continente.

Distribuição em Portugal

O chapim-de-poupa é uma espécie cuja distribuição tem um carácter marcadamente florestal. Nidifica no território continental, ocorrendo em habitats arborizados como montados densos, bosques mistos de pinheiros e sobreiros, pinhais de pinheiro-manso e matas de produção de pinheiro-bravo, onde parece ser mais abundante. Também ocorre em zonas de matos desenvolvidos, como por exemplo na serra da Malcata. Distribui-se amplamente de norte a sul do país, embora com algumas discontinuidades impostas sobretudo pela ausência de habitat adequado. A fraca conspicuidade da espécie poderá ter obstado à sua detecção nalguns locais, mas não deverá ter afectado grandemente o padrão de distribuição obtido. É de salientar a associação entre as áreas com abundâncias relativas mais elevadas e as principais zonas arborizadas do país, nomeadamente nas vastas áreas de pinhal do Centro, nas zonas de Alcácer do Sal, de Santo André, da serra de Grândola e das serras de Monchique e do Caldeirão.


A comparação do actual mapa de distribuição da espécie com o obtido no atlas nacional anterior evidencia uma grande semelhança, notando-se apenas uma ligeira expansão em algumas áreas do sotavento algarvio, da Beira Baixa e da Estremadura, as quais mantêm no entanto algumas discontinuidades. O maior esforço de prospecção efectuada no presente atlas pode ter contribuído para esta situação.

texto João E. Rabaça, ilustração Rafael Matias



Distribuição

	Cont.	Aço.	Mad.
Nid. possível	384	0	0
Nid. provável	168	0	0
Nid. confirmada	246	0	0



Abundância relativa

Frequência de ocorrência (%)

0 - 10
> 10 - 25
> 25 - 40
> 40 - 55
> 55 - 70
> 70 - 85
> 85 - 100
■ não quantificado

